

ABSENTEÍSMO: PRINCIPAIS CAUSAS ENTRE HOMENS TRABALHADORES BRAÇAIS DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA NO INTERIOR PAULISTA

ABSENTEEISM: MAIN CAUSES AMONG WORKERS MEN MENIAL OF A PUBLIC UNIVERSITY INSIDE PAULISTA

Renata de Oliveira Trasse¹
Maria Aparecida Tedeschi²

RESUMO: Objetivo: Identificar as causas de absenteísmo por doenças geradoras de afastamento do trabalho em servidores braçais, do sexo masculino, de uma universidade pública do interior paulista. **Métodos:** Para o estudo foi feito levantamento das licenças médicas dos servidores do sexo masculino, nos segmentos docentes e técnico-administrativos, que tiveram afastamentos por licença médica nos 24 meses anteriores ao início do estudo, englobando servidores regidos pelos dois regimes autárquicos e CLT. Constataram-se 187 afastamentos (31%), sendo 48% (91) das ocorrências de licenças médicas oriundas nos trabalhadores operacionais, sendo 4% na Fazenda de Ensino e 22% no Setor de Zeladoria, setores onde as tarefas são braçais. A coleta de dados de morbidade foi levantada nos prontuários médicos dos trabalhadores do serviço de saúde da instituição empregadora. Os dados foram compilados e armazenados em planilhas do Excel 2010 da Microsoft e submetidos à análise de frequência absoluta e percentual, sendo apresentados em forma descritiva, através de tabelas. **Resultados:** Os resultados apontaram que as Doenças do Sistema Osteomuscular (50,3%) seguidas das infecciosas (30,7%) são as que mais afastam em todas as faixas etárias nos setores pesquisados. Uma provável causa desencadeante da afecção osteomuscular nos trabalhadores desses setores pode estar associada aos fatores biomecânicos (posturas viciosas, força e repetitividade) e fatores ligados à organização do trabalho (aumento do ritmo, exigência do tempo). No que se refere às doenças infecciosas, embora acometa todas as faixas etárias, 20% dos trabalhadores mais velhos, maiores de 60 anos, precisaram afastar-se o dobro do tempo por complicações de outras naturezas associadas. A dengue é o maior agravo registrado, trazendo além de custos elevados para o tratamento na rede pública custos do afastamento do trabalhador para o Estado. **Conclusão:** As condições de vida e de trabalho estão diretamente relacionadas à saúde do trabalhador e do seu coletivo. O trabalho é um

¹ Mestre em Promoção da Saúde pela Universidade de Franca. Franca, São Paulo, Brasil e Assistente Social da UNESP - Ilha Solteira/SP, Brasil.

² Doutora em Enfermagem pela USP/SP, Brasil e Orientadora/Docente do Programa de Promoção da Saúde da Universidade de Franca. Franca, São Paulo, Brasil.

relevante determinante social e os agravos à saúde masculina devem ser pensados associados às condutas específicas do homem nos fatores culturais, sociais, ambientais e fundamentalmente ocupacionais.

Palavras-chave: absenteísmo; saúde; trabalhador; universidade.

ABSTRACT: Objective: To identify the causes of absenteeism by generating diseases of absence from work in menial servants, male, of a public university in São Paulo. **Methods:** For the study was done lifting of sick leave of male servers in segments teachers and technical administrators, who had absenteeism due to sick leave in the 24 months prior to the start of the study, encompassing servers governed by both municipal and CLT schemes. Found up 187 departures (31%) and 48% (91) of the occurrences of sick leave arising in operating workers, 4% in Farm Education and 22% in industry Janitorial, sectors where jobs are menial. The collection of morbidity data was raised in the medical records of workers in the health service institution. Os data were compiled and stored in the Microsoft Excel 2010 spreadsheet and analyzed through absolute and percentage frequency, are presented in a descriptive way, through tables. **Results:** The results showed that the Musculoskeletal System Diseases (50.3%) followed by infectious (30.7%) are the time more in all age groups in the sectors surveyed. A probable cause triggering of musculoskeletal disease in workers in these sectors may be associated with biomechanical factors (bad posture, strength and repeatability) and factors related to work organization (increased pace, time requirement). With regard to infectious diseases, but primarily affects all age groups, 20% of older workers over 60 years old, they had to move away twice as long by complications of other associated natures. Dengue is the most recorded offense, in addition to bringing high costs for treatment in the public employee's departure from the cost to the state. **Conclusion:** The conditions of life and work are directly related to the health of workers and their collective. Work is a social determinant relevant and injuries to men's health should be thought associated with male-specific behaviors in the cultural, social, environmental and occupational factors fundamentally.

Keywords: Absenteeism; health worked; university.