

DOI: 10.35621/23587490.v6.n5.p185-198

## AVALIAÇÃO DOS ÍNDICES DE MORTALIDADE POR SUICÍDIO NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB NOS ANOS DE 2016 E 2017

### EVALUATION OF SUICIDE MORTALITY INDICES IN SOUSA-PB CITY IN 2016 AND 2017

Sabrina Kénia Alves Celeste<sup>1</sup>  
Maximiliano Pucci Andrade de Oliveira<sup>2</sup>  
Renata Livia Silva Fonsêca Moreira de Medeiros<sup>3</sup>  
Macerlane de Lira Silva<sup>4</sup>

**RESUMO: Introdução:** A palavra suicídio tem origem no latim e significa *sui* = si mesmo e *caedes* = ação de matar, isto é, a morte de si mesmo. O suicídio é definido como uma morte por lesão autoprovocada, um ato voluntário contra a própria vida que resulta em morte, caracterizando uma trágica e intempestiva perda de vida humana. A crise suicida é determinada por comportamentos potencialmente autolesivos com evidência de que a pessoa tem o pensamento de se matar, sendo que o resultado de um ato suicida pode variar desde a não ocorrência de lesão até a morte. **Objetivo:** O presente trabalho tem como objetivo analisar, através das variáveis demográficas, o índice de mortes por suicídio no município de Sousa, interior da Paraíba, no período de 2016 e 2017. **Metodologia:** Trata-se de um estudo epidemiológico de carácter descritivo, retrospectivo com abordagem quantitativa. A pesquisa foi baseada em dados secundários coletados no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), com objetivo de analisar, através das variáveis demográficas, o índice de mortes por suicídio no Município de Sousa-PB, interior da Paraíba no período de 2016/2017. **Resultados e Discussões:** Segundo os resultados da pesquisa os homens cometem mais suicídios que as mulheres.

<sup>1</sup> Discente do curso de medicina da Faculdade Santa Maria.

<sup>2</sup> Docente da Faculdade Santa Maria - FSM. Médico Psiquiatra formado pela Universidade de Alfenas-MG, Residência em Clínica Médica na Casa de Saúde Santa Marcelina- SP e Residência em Psiquiatria no FHEMIG Hospital Raul Soares- MG.

<sup>3</sup> Docente da Faculdade Santa Maria - FSM. Enfermeira pela Universidade Federal da Paraíba-UFPB. Especialista em Saúde Pública pela FACISA. Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba -UFPB. Doutora em Pesquisa em Cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa de São Paulo - FCMSP.

<sup>4</sup> Docente da Faculdade Santa Maria - FSM. Graduação em Enfermagem pela FSM Cajazeiras, especialização em política e gestão do cuidado com ênfase no apoio matricial pela UFPB e mestrado em Saúde Coletiva pela UNISANTOS.

Estima-se que o suicídio seja a terceira causa de morte na faixa etária dos 15-34 anos. Quanto a população idosa, os dados mostram também um índice relevante entre essa população. A pesquisa chama atenção para o local de maior índice de ocorrência de suicídios que ocorrem nos próprios ambientes domiciliares e como método usado na execução do ato suicida destaca-se mortes por enforcamento/estrangulamento/sufocamento como principal meio prevalente. **Conclusão:** O estudo mostra que, independente da faixa etária, sexo, idade, deve-se ter sempre um olhar holístico para atitudes e comportamentos das pessoas que muitas vezes, de maneira informal, acenam por socorro, mas diversas vezes são ignoradas, negligenciadas e/ou não são observadas como deveriam perante os familiares, amigos, companheiro, sociedade e autoridades.

**Descritores:** Mortalidade. Suicídio. Variáveis demográficas.

**ABSTRACT: Introduction:** *The word suicide originates from Latin and means sui = self and caedes = killing action, that is, the death of oneself. Suicide is defined as a death by self-harm, a voluntary act against one's life that results in death characterizing a tragic and untimely loss of human life. The suicidal crisis is defined as potentially self-injurious behaviors with evidence that the person has the thought of killing himself, and the result of a suicidal act can vary from no injury to death.* **Objective:** *This study aims to analyze, through demographic variables, the rate of suicide deaths in the municipality of Sousa, interior of Paraíba, in the period 2016 and 2017.* **Methodology:** *This is a descriptive epidemiological method. retrospective with quantitative approach. The research was based on secondary data collected in the Mortality Information System (SIM), aiming to analyze, through demographic variables, the suicide death rate in the city of Sousa-PB, Paraíba, Brazil, in 2016/2017.* **Results and Discussion:** *According to the survey results men commit more suicides than women. Suicide is estimated to be the third leading cause of death in the 15-34 age group. Regarding the elderly population, the data also show a relevant index among this population. The research draws attention to the place of highest occurrence of suicides that are in their own home environments and as a method used in the execution of suicide act hangs / strangulation / suffocation deaths as the main prevalent means.* **Conclusion:** *The study shows that regardless of age, gender, age, one should have a holistic look at the attitudes and behaviors of people who often informally wave for help but are often ignored, neglected and / or not observed. as they should to family, friends, partner, society and authorities.*

**Descriptors:** mortality, suicide, demographic variables.