

DOI: 10.35621/23587490.v8.n1.p953-969

EFEITOS DO USO DA ISOTRETINOINA ORAL NA PAPILOMATOSE CONFLUENTE E RETICULADA: RELATO DE CASO

EFFECTS OF THE USE OF ORAL ISOTRETINOIN IN CONFLUENT AND RETICULATED PAPILOMATOSIS: CASE REPORT

Millena Nóbrega Dantas de Freitas¹
Lívio e Vasconcelos do Egyp²

RESUMO: O objetivo desse estudo foi determinar quais as principais manifestações da papilomatose confluyente e reticulada e sua resposta ao tratamento com isotretinoína oral. **Métodos:** O presente estudo refere-se a uma descrição de um relato de caso, sendo um estudo observacional de aspecto descritivo com caráter qualitativo, o qual tem como objeto de estudo a terapia medicamentosa com isotretinoína oral em paciente diagnosticado com papilomatose reticular e confluyente. O estudo foi realizado no Centro de especialidades Frei Damião, localizado na cidade de Patos no estado da Paraíba, onde o paciente será acompanhado ambulatorialmente. **Descrição do relato:** A paciente do relato em questão procurou o serviço de dermatologia da NEUREDERM, apresentando manchas escurecidas em dorso e nas pernas desde os 15 anos de idade. Em seu quadro clínico foram identificadas máculas acastanhadas com leve descamação em região do dorso, principalmente região interescapular e nas pernas desde a adolescência, tendo sido realizado o diagnóstico de papilomatose confluyente e reticulada. **Conclusão:** o tratamento com isotretinoína oral tem mostrado eficácia no controle da progressão das lesões quando o tratamento com antibióticos como minociclina não apresentarem melhora.

Palavras chave: Papilomatose. Isotretinoína. Relato de caso.

ABSTRACT: *The objective this study was determinate the main manifestations of confluyente and reticulated papillomatosis and its response to treatment with oral isotretinoin. **Methods:** The present study refers to a description of a case report, being an observational study of a descriptive aspect with a qualitative character,*

¹ Graduanda em Medicina. Centro Universitário de Patos - UNIFIP, Patos, Paraíba, Brasil.

² Médico Especialista em Dermatologia. Centro Universitário de Patos - UNIFIP, Patos, Paraíba, Brasil.

which has as object of study the drug therapy with oral isotretinoin in a patient diagnosed with reticular and confluent papillomatosis. The study was carried out at the Frei Damião specialty center, located in the city of Patos in the state of Paraíba, where the patient will be followed up on an outpatient basis. **Description of the report:** The patient in the report in question sought the dermatology service of NEUREDERM, with darkened spots on the back and legs since she was 15 years old. In his clinical picture, brownish macules with slight desquamation were identified in the dorsal region, mainly the interscapular region and in the legs since adolescence. **Conclusion:** treatment with oral isotretinoin has been shown to be effective in controlling the progression of lesions when treatment with antibiotics such as minocycline does not show improvement.

Keywords: Papillomatosis. Isotretinoin. Case report.