

DOI: 10.35621/23587490.v8.n1.p1186-1199

CARACTERÍSTICAS DAS GESTANTES ATENDIDAS EM CONSULTA DE ENFERMAGEM AMBULATORIAL DE PRÉ-NATAL: RETRATO DE UMA DÉCADA

CHARACTERISTICS OF PREGNANT WOMEN ATTENDED IN PRENATAL OUTPATIENT NURSING CONSULTATION: PORTRAIT OF A DECADE

Andressa Carlos Silva Gonçalves¹

Geane Silva Oliveira²

Renata Livia Silva Moreira Fonseca de Medeiros³

Ocilma Barros de Quental⁴

INTRODUÇÃO: A gestação é um evento natural, constituído de inúmeras mudanças físicas, psicológicas e sociais. Arelado à gestação, está um grande problema enfrentado pela saúde pública, a morbimortalidade materna, que embora esteja em crescente queda nos últimos anos, ainda é um agravo considerável. As unidades básicas de saúde são a porta de entrada do SUS, no tocante a prevenção, proteção e promoção da saúde. E dentro desse serviço, temos a assistência ao pré-natal, que busca através do acompanhamento contínuo assegurar um sadio decorrer do ciclo gestacional e proporcionar o nascimento de um bebê saudável. **OBJETIVO:** apresentar as características das gestantes atendidas em consultas de enfermagem ambulatoriais no período de 2011-2021. **METODOLOGIA:** O estudo trata-se de um levantamento retrospectivo, que foi realizado através de pesquisa documental. A mesma ocorreu por meio de consulta ao banco de dados do Sistema de Informação do Pré-natal (Sisprenatal), na Secretaria Municipal de Saúde de Umari-ce, no setor de Informática. Foi feita análise das seguintes variáveis número de gestantes cadastradas, faixa etária, raça/cor, classificação de risco, testes rápidos e exames. Posteriormente a coleta dos dados, ocorreu à elaboração das tabelas, contemplando as variáveis da pesquisa. Só após a ciência e concordância da Secretaria Municipal de Umari-Ce, o protocolo do estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade Santa, conforme Resolução CNS Nº 466 de 201 com parecer nº 5.110.876 de aprovação. **RESULTADOS:** A análise das variáveis mostrou deficiências na assistência prestada, principalmente com

¹ Graduanda de Enfermagem pela Faculdade Santa Maria- FSM, Cajazeiras, PB.

² Mestre, Docente da Faculdade Santa Maria- FSM, Cajazeiras, PB.

³ Doutora, Docente da Faculdade Santa Maria- FSM, Cajazeiras, PB.

⁴ Doutora, Docente da Faculdade Santa Maria- FSM, Cajazeiras, PB.

relação à captação precoce e realização de exames. Considerando a amostra, 65,5% foram cadastradas até a 12ª semana de gestação, 47% foram submetidas a seis ou mais consultas, 34% referiram idade acima de 34 anos, 62% foram classificadas dentro dos parâmetros para alto risco gestacional. Os resultados apontaram ausência no quesito “exames solicitados no terceiro trimestre” para o grupo estudado. **CONCLUSÃO:** O estudo revela fragilidade na captação precoce das gestantes para início do acompanhamento pré-natal, retratando a presença de alto risco entre a amostra, assim como discrepância entre os componentes solicitação e realização de testes rápidos e exames laboratoriais.

PALAVRAS CHAVE: Gravidez; Cuidado pré-natal; Cuidados de enfermagem; Enfermagem Obstétrica; Atenção Primária à Saúde;

INTRODUCTION: Pregnancy is a natural event, consisting of numerous physical, psychological and social changes. Linked to pregnancy, there is a major problem faced by public health, maternal morbidity and mortality, which, although decreasing in recent years, is still a considerable problem. Basic health units are the gateway to the SUS in terms of prevention, protection and health promotion. And within this service, we have prenatal care, which seeks, through continuous monitoring, to ensure a healthy course of the gestational cycle and provide for the birth of a healthy baby. **OBJECTIVE:** to present the characteristics of pregnant women attended in outpatient nursing consultations in the period 2011-2021. **METHODOLOGY:** The study is a retrospective survey, which was carried out through documentary research. The same occurred through consultation of the database of the Prenatal Information System (Sisprenatal), at the Municipal Health Department of Umari-ce, in the Information Technology sector. The following variables were analyzed: number of registered pregnant women, age group, race/color, risk classification, rapid tests and exams. After data collection, tables were drawn up, considering the research variables. Only after acknowledgment and agreement by the Municipal Secretariat of Umari-Ce, the study protocol was submitted to the Ethics Committee for Research with Human Beings of the Faculdade Santa, according to CNS Resolution No. 466 of 201 with Opinion No. 5,110,876 of approval. **RESULTS:** The analysis of the variables showed deficiencies in the care provided, especially in relation to early recruitment and exams. Considering the sample, 65.5% were registered until the 12th week of pregnancy, 47% underwent six or more consultations, 34% reported age over 34 years, 62% were classified within the parameters for high gestational risk. The results showed an absence in the *item “exams requested in the third trimester” for the studied group.* **CONCLUSION:** The study reveals weakness in the early recruitment of pregnant women to start prenatal care, portraying the presence of high risk among the sample, as well as a discrepancy between the components requesting and carrying out rapid tests and laboratory tests.

KEYWORDS: Pregnancy; Prenatal care; Nursing care; Obstetric Nursing; Primary Health Care.