

DOI: 10.35621/23587490.v11.n1.p866-881

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO SUICÍDIO NO ALTO SERTÃO PARAIBANO

EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF SUICIDE IN THE ALTO SERTÃO OF PARAÍBA

Maria Zilda Melo Regis¹

RESUMO: **Introdução:** As taxas de suicídio estão aumentando no mundo, configurando um problema em saúde pública. **Objetivo:** O objetivo deste trabalho foi caracterizar o perfil das vítimas de suicídio na 9ª Região de Saúde da Paraíba, no período de 2009 a 2019. **Método:** Trata-se de um estudo do tipo ecológico de série temporal com abordagem quantitativa. Os dados foram obtidos a partir do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e analisados segundo variáveis como sexo, idade, estado civil, escolaridade, raça, método utilizado e local de ocorrência. Utilizou-se o modelo de regressão linear simples para verificar a tendência dos óbitos no referido período. **Resultados:** No período estudado ocorreram 125 óbitos na 9ª Região de Saúde da Paraíba, correspondendo a uma taxa média de 6,5 mortes por 100 mil habitantes. O predomínio das mortes ocorreu nos indivíduos do sexo masculino, de cor parda, na faixa etária de 40-49 anos e casados. O método mais utilizado foi o enforcamento, seguido do uso de armas de fogo. Observou-se tendência crescente das taxas de mortalidade por suicídio. **Conclusão:** Nesse contexto, revela-se a necessidade de abordar esse problema multifatorial com ferramentas e operadores de cuidado, rastreio, acolhimento e condutas efetivas para minorar vicissitudes ligadas ao suicídio e suas consequências.

Palavras-chave: Suicídio. Saúde Mental. Epidemiologia. Mortalidade.

ABSTRACT: **Introduction:** The suicide rates are increasing in the world, representing a public health problem. **Objective:** The objective of this study was to characterize the profile of suicide victims in the 9th Health Region of Paraíba, in the period from 2009 to 2019. **Method:** This is an ecological time series study with a quantitative approach. The data were obtained from the Mortality Information System (SIM) of the Informatics Department of the Unified Health System (DATASUS) and analyzed according to

¹ Médica Residente de Medicina de Família e Comunidade pela UFCG-HUJB. E-mail: m.zilda_melo@hotmail.com.

variables such as sex, age, marital status, education, race, method used and place of occurrence. The simple linear regression model was used to verify the trend of deaths in that period. **Results:** During the study period, 125 deaths occurred in the 9th Health Region of Paraíba, corresponding to an average rate of 6.5 deaths per 100 thousand inhabitants. The predominance of deaths occurred in male individuals, brown in color, *aged 40–49 years* and married. The most used method was hanging, followed by firearms. There was an increasing trend in mortality rates due to suicide. **Conclusion:** In this context, it is necessary to address this multifactorial problem with tools and operators of care, screening, reception and effective conducts to alleviate vicissitudes related to suicide and its consequences.

Keywords: Suicide. Mental health. Epidemiology. Mortality.